Wiederholung

■ Chinesischer Restsatz

- $\mathbb{Z}_N \cong \mathbb{Z}_{m_1} \times \dots \times \mathbb{Z}_{m_n}$
- $\mathbb{Z}_N^* \cong \mathbb{Z}_{m_1}^* \times \dots \times \mathbb{Z}_{m_n}^*$
- Quadratwurzeln der 1 sind $(\pm 1, \pm 1, \dots, \pm 1)$
- Nichttriviale Quadratwurzeln erlauben Faktorisierung

■ RSA

- Schlüsselgenerierung
- Ver-/ und Entschlüsselung
- Faktorisieren $\Leftrightarrow$ Berechnen von $\phi(N)$ $\Leftrightarrow$ Berechnen von d

Sicherheit von RSA

RSA-Problem

Gegeben: N , e , $c = m^e \pmod{N}$

Gesucht: $m \in \mathbb{Z}_N$

- D.h. $m = c^{1/e} \pmod{N}$ ist die e -te Wurzel von c in $\mathbb{Z}_N$.
- Beachte: Spezialfälle für e -te Wurzeln sind leicht.
 - Sei $m^e < N$. Dann kann $c^{1/e}$ in $\mathbb{N}$ leicht berechnet werden.
- Faktorisieren ist nicht NP-schwer (unter geeigneten Komplexitätsannahmen).
- Offenes Problem:
 - Algorithmus für e -te Wurzeln $\Rightarrow$ Algorithmus zum Faktorisieren

Polynome

Form $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$

- a_i : Koeffizienten des Polynoms
 - $p(x) \in R[x]$, falls $a_i \in R$ (z.B. $R = \mathbb{Z}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$)
- $\text{grad}(p) := \max\{i \in \mathbb{N}_0 \mid a_i \neq 0\}$
 - $\text{grad}(0) := (-1)$

Annahme: Operationen (+, -, *, /) auf a_i und x in Zeit $\mathcal{O}(1)$.

Frage: Komplexität von (+, -, *, /, Auswerten) für Polynome?

Auswerten eines Polynoms

Naive Auswertung von $p(x) = a_n x^n + \dots + a_0$:

- $\sum_{i=0}^{n+1} i = \mathcal{O}(n^2)$ Multiplikationen und n Additionen
- Gesamt: $\mathcal{O}(n^2)$

Horner Schema:

$$p(x) = ((\dots((a_n * x + a_{n-1}) * x + a_{n-2}) + \dots) * x + a_1) * x + a_0$$

- n Multiplikationen und n Additionen
- Gesamt: $\mathcal{O}(n)$

Addition/Subtraktion von $p(x)$

Seien $a(x) = a_n x^n + \dots + a_0$, $b(x) = b_m x^m + \dots + b_0$

- ObdA $n > m$. Setze $b_{m+1} = \dots = b_n = 0$.

$(a+b)(x) = c_n x^n + \dots + c_0$ mit $c_i = a_i + b_i$ für $0 \leq i \leq n$

- Laufzeit Addition/Subtraktion: $\mathcal{O}(n)$

Multiplikation Schulmethode

Seien $a(x) = a_n x^n + \dots + a_0$, $b(x) = b_m x^m + \dots + b_0$

$$(a \cdot b)(x) = (a_n \cdot b_m) x^{n+m} + (a_{n-1} b_m + a_n b_{m-1}) x^{n+m-1} + \dots + (a_0 b_1 + a_1 b_0) x + a_0 b_0$$
$$= \sum_{i=0}^{n+m} c_i x^i \text{ mit } c_i = \sum_{j=0}^i a_j b_{i-j}$$

- Beachte: $a_{n+1} = \dots = a_{n+m} = 0$ und $b_{m+1} = \dots = b_{n+m} = 0$
- Laufzeit: ObdA $n \geq m$
 - Höchstens $2n+1$ Koeffizienten
 - $\mathcal{O}(n)$ Additionen und Multiplikationen pro Koeffizient
 - Gesamt: $\mathcal{O}(n^2)$ Operationen
- Ziel: Laufzeit $\mathcal{O}(n \log n)$

Division Schulmethode

Satz: Seien $a(x), b(x) \in \mathbb{Q}[x]$ mit $b(x) \neq 0$. Dann gibt es $q(x), r(x) \in \mathbb{Q}[x]$ mit $a(x) = q(x) \cdot b(x) + r(x)$ mit $\text{grad}(r) < \text{grad}(b)$.

Sei $\text{grad}(a)=n$, $\text{grad}(b)=m$.

Existenz:

Für $n < m$: Setze $q(x)=0$, $r(x)=a(x)$.

Sei $n \geq m$. Beweis per Induktion über n

- IA: Für $n=0$ gilt $m=0$. Setze $q(x)=1$ und $r(x)=0$.
- IS $n-1 \rightarrow n$: $a'(x) = a(x) - a_n/b_m x^{n-m} \cdot b(x)$ hat $\text{Grad} \leq n-1$
 - IV: $\exists q'(x), r'(x)$ mit $a'(x) = q'(x) \cdot b(x) + r'(x)$ mit $\text{grad}(r') < \text{grad}(b)$
 $\Rightarrow a(x) = a'(x) + a_n/b_m x^{n-m} \cdot b(x) = (q'(x) + a_n/b_m x^{n-m}) \cdot b(x) + r'(x)$ mit $\text{grad}(r') < \text{grad}(b)$.

Eindeutigkeit:

Sei $a=q \cdot b+r=q' \cdot b+r'$ mit $(q,r) \neq (q',r')$ und $\text{grad}(r), \text{grad}(r') < \text{grad}(b)$

- Es gilt $b(q-q') = r'-r$
- Wegen $\text{grad}(r'-r) \leq \text{grad}(r') < \text{grad}(b)$ muss $q=q'$ gelten.
- Damit ist $0 = r'-r$ und daher $r=r'$.

Liefert Methode mit Laufzeit $\mathcal{O}(n^2)$.

Point-value Repräsentation

- Sei $a(x)$ Polynom vom Grad $< n$.
- Seien $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ paarweise verschieden.
- Sei $y_i = a(x_i)$ für $0 \leq i \leq n-1$.
- $\{(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_{n-1}, y_{n-1})\}$ heisst Point-value Form von $a(x)$.

Satz: Sei $\{(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_{n-1}, y_{n-1})\}$ eine Point-value Form. Dann gibt es ein eindeutiges $a(x)$ mit $\text{grad}(a) < n$ mit $a(x_i) = y_i$ für $i = 0, \dots, n-1$.

Finde Koeffizienten $a_0, \dots, a_{n-1}$ mit

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^{n-1} \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & x_{n-1}^2 & \dots & x_{n-1}^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_{n-1} \end{pmatrix}$$

Vandermonde-Matrix ist invertierbar für paarweise verschiedene x_i .

⇒ Existenz und Eindeutigkeit des Lösungsvektors $(a_0, \dots, a_{n-1})$.

Alternativ: Lagrange Interpolation

Lagrange Interpolation

■ Setze

$$p_k(x) = \frac{\prod_{j \neq k} x - x_j}{\prod_{j \neq k} x_k - x_j} \quad \text{und} \quad a(x) = \sum_{k=0}^n y_k p_k(x)$$

- Jedes der $p_k(x)$ hat Grad n , daher auch $a(x)$.
- $p_k(x_k)=1$ und $p_k(x_i) = 0$ für $i \neq k$
- Daher gilt $a(x_i) = y_i$ für $i=0, \dots, k$

Arithmetik mit Point-value Form

Addition: Sei $c(x) = a(x) + b(x)$.

- $a(x) = \{(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)\}$
- $b(x) = \{(x_0, y_0'), \dots, (x_n, y_n')\}$
- $c(x) = \{(x_0, y_0 + y_0'), \dots, (x_n, y_n + y_n')\}$

Addition in $\mathcal{O}(n)$

Multiplikation: Sei $c(x) = a(x) * b(x)$, $\text{grad}(a), \text{grad}(b) < n$

- $a(x) = \{(x_0, y_0), \dots, (x_{2n-1}, y_{2n-1})\}$
- $b(x) = \{(x_0, y_0'), \dots, (x_{2n-1}, y_{2n-1}')\}$
- $c(x) = \{(x_0, y_0 * y_0'), \dots, (x_{2n-1}, y_{2n-1} * y_{2n-1}')\}$

Multiplikation in $\mathcal{O}(n)$

Problem:

- Konvertierung Koeffizientenform $\rightarrow$ Point-value Form:
 - Auswerten von Polynom an n Stellen: $\mathcal{O}(n^2)$ mit Horner-Schema
- Konvertierung Point-value Form $\rightarrow$ Koeffizientenform:
 - Lagrange-Interpolation in Zeit $\mathcal{O}(n^2)$.

Lösung: Werten an geeigneten Stellen aus: $2n$ -te Einheitswurzeln ω_{2n} .

Multiplizieren von Polynomen

Koeffizientenform

Point-value Form

n-te Einheitswurzeln

Def: Eine n-te Einheitswurzel ist eine komplexe Zahl $\omega \in \mathbb{C}$ mit der Eigenschaft $\omega^n = 1$

- Es gibt exakt n viele n-te Einheitswurzeln
 $e^{2\pi i k/n}$ für $k=0,1,\dots,n-1$
- Erinnerung: $e^{i\alpha} = \cos(\alpha) + i\sin(\alpha)$
 - n-te Einheitswurzeln besitzen gleichen Abstand auf dem Einheitskreis in der komplexen Ebene
- $\omega_n = e^{2\pi i/n}$ heißt primitive n-te Einheitswurzel
 - Alle n-ten Einheitswurzeln sind Potenzen von ω_n